

| 年月        | 疾患名   | 人数  | 検査内容                      | 治療内容  | 投薬内容   |
|-----------|-------|-----|---------------------------|-------|--|
| 平成 31年 4月 | 尿路感染症 | 2名  | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml  |
|           | 急性肺炎  | 10名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフトアジジム静注用1g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>生食注100ml+メロペネム0.5g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>糖液5%500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml<br>ランックス注20mg               |
| 令和 元年 5月  | 尿路感染症 | 4名  | 血液検査<br>診察<br>尿検査         | 投薬・点滴 | ユナシン錠375mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml   |
|           | 急性肺炎  | 9名  | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフトリアキソンNa静注用1g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>生食注100ml+メロペネム点滴静注用0.5g<br>生食注100ml+ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml |
| 令和 元年 6月  | 急性肺炎  | 7名  | 血液検査<br>診察<br>画像診断        | 投薬・点滴 | ユナシン錠375mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml  |
| 令和 元年 7月  | 急性肺炎  | 7名  | 血液検査<br>診察<br>画像診断        | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml   |
| 令和 元年 8月  | 急性肺炎  | 2名  | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>ユナシン錠375mg<br>キシロカイン注ポリアンブ0.5%3ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+セフトアジジム静注用1g<br>フルクトラクト注500ml  |

|           |       |    |                           |       |   |
|-----------|-------|----|---------------------------|-------|---|
| 令和 元年 9月  | 急性肺炎  | 2名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断        | 点滴    | 生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml   |
| 令和 元年 10月 | 急性肺炎  | 6名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断        | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml   |
| 令和 元年 11月 | 尿路感染症 | 3名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml   |
|           | 急性肺炎  | 2名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴    | 生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>生理食塩液ヒカリ500ml<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>ラクトリンゲル液500ml   |
| 令和 元年 12月 | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査         | 投薬    | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg   |
|           | 急性肺炎  | 5名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>キシロカイン注ポリアンプ0.5%3cc+ピペラシリンNa注射用2g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピシリバクタ静注用1.5g<br>生食注100ml+メロペナム点滴静注用0.5g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml |
| 令和 2年 1月  | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴    | 生食注100ml+ピシリバクタ静注用1.5g  |
|           | 急性肺炎  | 5名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴    | キシロカイン注ポリアンプ0.5%3cc+ピペラシリンNa注射用1g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピシリバクタ静注用1.5g<br>生食注100ml+ミノサイクリン100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml         |

|          |       |    |                           |       |  |
|----------|-------|----|---------------------------|-------|--|
| 令和 2年 2月 | 尿路感染症 | 1名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴    | 生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+ピシリバクタ静注用3g<br>フルクトラクト注500ml   |
|          | 急性肺炎  | 7名 | 血液検査<br>診察<br>尿検査<br>画像診断 | 点滴    | キシロカイン注ポリアンプ0.5%3cc+ピペラシリンNa注射用1g<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+セフトリアキソンNa静注用1g<br>生食注100ml+ピシリバクタ静注用3g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用2g<br>生食注100ml+ミノサイクリン100mg<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml |
| 令和 2年 3月 | 尿路感染症 | 1名 | 診察<br>尿検査                 | 投薬    | ユナシン錠375mg   |
|          | 急性肺炎  | 5名 | 血液検査<br>診察<br>画像診断        | 投薬・点滴 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg<br>生食注100ml+セフォセフ静注用1g<br>生食注100ml+セフトリアキソンNa静注用1g<br>生食注100ml+ピペラシリンNa注射用1g<br>ソルデム3AG輸液500ml<br>フルクトラクト注500ml<br>ラクトリンゲル液500ml   |